

зала 18. шкафъ 4. полка 3. № 174.

Byar.

19+

зала 18. шкафъ 4. полка 3. № 174.

ГАЧАЛЬНЫЯ ОСНОВАНІЯ

всеобщей

ПАООЛОГІИ.

Сочиненіе

Д. фридерика Гилдебрандта

Медицинской Практики и Хеміи вь Университеть Ерлангскомь Профессора Ординарнаго Публичнаго, многихь Академій и Обществь Члена.

Переведено св Нъмецкаго.

въ санктпетербургъ,

Вь Типографіи Государственной Медицинской Коллегіи, 1800 года.



RIHARONDO BUNDALPAR

ETHTOTON'S

HETOLOGEH.

Sinouaro3 /

the first power Was geopen and

подповой правиния и X чів ть о тогинов. В повитов. В п

along the fire property of

BE CAUSTING BEBURLE,

Tanorpa de Romanne esta de la resulta de la compansión de

учап;имся врачебной наукъ

усердивише

посвящае шся.

учанинися врачквной наукъ

yeepanbume

по,свищае пев

начальныя основанія

ПАӨОЛОГІИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О бользняхь вообще.

Павологією называется та часть Врачебной науки, которая руководствуеть кр познанію бользней. * Она есть основаніемь Оерапіи, которая предлагаеть правила кр льченію бользней.

* Павологія вообще простираєтся на вст органическія трла, поколику онт бользнямь суть подвержены. Но мы поды именемь симь разумьемь здтов преимущественно Павологію человтческаго ттла, вы которомы смысль взымаєтся она обыкновенно, хотя бы и не приложено кы ней было посліднее реченіє.

S. 2. : : : a et ofter ?

Бользные (morbus) называемы мы всякое состояние оты здравия далеко уклоняющееся.

§. 3.

Всякая бользнь дьлаеть разстройку вы одномы, либо другомы, либо и вы множайшихы живато тыла дъйствіяхь. Сія разстройка какаголибо дыствія состоить вы томы, что оно либо 1) уменьшается, или и совсымы перестаеть, либо 2) умножается, иногда даже до жестокости, либо 3) производится непорядочнымы и притомы вреднымы образомы.

ем пользни суть либо

- т) Повсемственныя (universales), вы коихы
- 2) Мъстныя (partiales, locales), въ коихъ одна, или нъкоторыя части тъла страждуть. Иногда мъстная бользны перемъняется въ повсемственную, и на обороть.

3 War and Co 11 5.

Местныя бользни бывають либо

- т) Внутреннія (interni), которыя віз какойлибо изіз трехіз большихіз полостей; тіла т. е. віз головіз, груди, брюхіз; либо стато півичні бло половіз половіз
 - 2) Вившиіл (externi), которыя вив

сихв полостей мвстопребывание свое имвющв.

§. 6.

М встныя бользни бывають далье либо

- I) Неподвижным (fixi), кои чрезъ все теченіе свое въ одной какоймибо части находятся; либо
- 2) Мысто перемыняющія (vagi), кои отв одной части переходять кв другой; либо
- 3) Обратныя (retrogradi), кои побывы нъсколько времени на внъшнихъ частяхь, бросаются ко внутреннимь.

§. 7: .. : "0"

Поелику твло состоить изв плотныхв и жидкихв частей: то, вв разсужденіи сего, бользни раздвлить можно на бользни

- 1) Плотных в частей и
- 2)- Жи якостей.

Посліднія (morbi humorales) суть большею частію дійствіе первыхв.

as market to the st. S. S.

напосльдоко раздъляюто еще бо-

1) Простыя (fimplices) и

совмостно во трар находиться мотуть.

TAABA BTOPAH.

О причинахь бользней.

§. 9.

Причиною болдэни (caufa morbi) называется то, что производить бользив. Произхождение бользии зависить большею частию оть содьйствия и вскольких причинь такь, что каждая изыричинь вы произведении оной участвуеть, но никакая изынихь сама собою порозны не содылываеть бользии.

S. 10. .: 6 ...

Причины бользней, по различному ихв отношенію кв бользни, бываютв различны. Вопервых в различать должно причины разлолагающіх и случайных.

§. II.

Вь шрир живомр находящся нркоторыя свойства такія, что трло имрющее одно какоелибо изв нихв, бываетв чрезв то способнымв, либо весьма преклоннымв, либо по крайней мврв преклоннымв, либо по крайней мврв преклонные другихв твлю онаго свойства вв се в не имвющихв, кв воспріятію изввстныхв бользней. Вв рассужденіи сего, таковое свойство называется способствующею, либо преклоняющею причиною (caufa praedifponens, pröegumena), либо также разположеніемв (dispositio, оррогитітая) кв какойлибо бользни. Сія причина сама собою не производить бользни, естьли не присовокупится кв ней другая, случайная.

§. 12.

Случайными причинами (causa accidens, occasionalis, procatarctica) бользней вы разсужденіи человыческаго тыла зовутся всы вещи, коихы дыйствію оно подверженно такь, что оны его перемычить и бользнь произвесть могуть, естьли вы немы способность, или най-паче преклонность кы бользни находится.

§. 13. ·..

Большая часть бользней суть дый-

чины такь, что кь преклоняющей, чрезь извъстное время находившейся уже вь тьль, привниходить случайная, и оть обоюднаго ихь содьйствія произходить бользнь. Однако случайная причина, дьйствуя довольно сильно, можеть произвесть бользнь при одной только способности (§. 11.) тьла кь воспріятію ея, хотя дальньйшей кь тюму преклонности вь немь и не будеть.

9. 14.

Потомъ различать должно внъшнія и внутреннія причины бользней.

Вившийя (externae) до произведения оными бользни, не были еще вы тыль: ч но привнишли туда снаружи при произхождении самой бользни.

Внутреннія (internae) прежде произшествія бользни, чрезь извыстное время вы півль уже существовали.

§. 15.

Есть бользни, которыя, исключая способствующія причины, произходять единственно от наружных в причинь, и напротивь того есть бользни одными внутренними причинами производимыя. Вы нькоторыхы же бользняхы обоихы

сихь родовь причины участвують, даже и вь такихь, кои одньми только вившними причинами произведены быть кажутся. Отсюда произходить то, что могущее быть внышнею причиною какойлибо бользни, не во всьхь тылахь производить бользнь, и что одна и таже внышняя причина вь различных тылахь можеть причинить различныя бользни.

§. 16.

Наконецъ отдаленных причины различають обыкновенно оты ближнихь.

Ближнею причиною (causa proxima) бользни называется то, что непосредственно производить оную.

Отдаленными же (remotae) именуются ть, кои содьлали ближнюю. Но во многихь бользняхь бываеть связь множайшихь причинь, изь коихь нько-торыя, вь разсуждении сего, кь бользни суть ближе, а другія отдаленные такь, что первая причина произвела вторую, вторая третію и т. д.

§ . 17.

Между многоразличными причинами бользней примьчаемь мы вопервых всещи такь называемыя натуральных (res

naturales) m. e. изврстныя свойства здороваго трла, св нимв неразлучныя, какь то: возрасть, поль, наружній видь тьла, темпераменть, идіосинкрасія, насльдственное свойство. Они принадлежать вы способствующимы и преклоняющимь (б. 11.) причинамь, т. е. они сами собою не производящь бользни, естьли другаго рода причина кв нимв не присовокупится. Нѣкоторыя изв нихв дриствують то только, что вы тыль, вь коемь они находятся, могуть зародишься изврстныя бользни; другія же далають его и дайствительно преклоннымь кв полученію извістныхв болбзней.

6. 18.

1) Bospacmb (aetas).

Дъти по причинъ большей слабкости (laxitas) плотныхъ ихъ частей, по большей раздражимости мышечныхъ волоконъ, большей чувствительности нервовъ и большей нъжности и узкости ихъ сосудовъ, преклонны больше къ извъстнымъ болъзнямъ.

Вь юношахь находится преклонность другаго свойства; поелику напряженность (tonus) мышечных волокон уних больше двиской, соединенная притом еще св великою раздражимостію.

Престартьые люди имбють преклонность также кь другимь бользнямь оть окрыплости мышечныхь ихь волоконь и оть умаленія раздражимости и чувствительности происходящимь.

§. 19.

2) Hond (sexus). At the second discounting

Мущинамъ свойственны суть бользни частей поль мужескій; а женщинамь поль женскій составляющихь. Сверхь того, мущины по большей крьпости плотныхь ихь частей, по большей длинь и узкости мочеиспускательнаго ствола, больше подверженны извъстнымь бользнямь; а женщины по большой слабкости плотныхь ихь частей и большей движимости нервной системы больше суть преклонны кь друтимь извъстнымь бользнямь.

§. 20.

3) Наружный видь тыла (corporis habitus). Длинныя тонкія тыла, имыющія длинную тонкую шею, плоскую и узкую грудь, разположены ко другимо болованямо, нежели пола короткия, толстыя, округлыя, толстую и короткую шею имбющія.

§. 21.

4) Темпераменть (Temperamentum). Подь симь именемь разумью я относительную великость напряженности, раздражимости, чувствительности, и содержание свойствь сихь другь кь другу вь живомь тьль.

Такимъ образомъ различаю я темпераменты:

- I. 1) Крълкой, раздражительной и чувстви-
- 2) и мало чувствительной.
- 3) мало раздражительной и чувствительной.
- 4) и мало чувствительной.
- Слабой, разаражительной и чувствительной.
- 6) и мало чувствительной.
 - 7) мало раздражительной и чувствительной.
 - 8) и мало чувствительной.
 - 5) Идіосинкрасіа т. е. особливое свой-

ство нервной системы, по причинь котораго извыстныя впечатльнія внытнихь вещей дыйствують на нее особливымь и другимь, противу множай шихь людей, образомь.

§: 23.

6) Наслъдственная преклонность.

Въроятно и опытомъ доказано, что разположение къ извъстнымъ бользнямъ (поелику оно отъ образования, темперамента, слабости одной или другой внутренности и проч. зависить) можеть отъ родителей сообщаться дътямь, подобно какъ ежедневно примъчаемъ мы сіе въ сходствъ тълеснаго вида, а найпаче лица. Бользни отъ таковой преклонности произходящія и многимъ иногда одного кольна (фамиліи) людямъ общія наслъдственными (т. haereditarii) называются.

§. 24.

причинамь принадлежать различныя сещи, коихь действию теловыческое подвержено, поколику оне всегда и непремено, или при известныхь только обстоятельствахь, бывають

для него вредными. Онб суть внюшнія (§. 14.) и случайныя (§. 12.) причины. Многія изб нихб, по различію ихб силы, продолжимости ихб дбйствія и свойства тбла, на которое они дбйствують, могуть быть и полезными и вредными.

§- 25.

Сюда относятся вообще извѣстныя бользнетворных раздраженія (irritamenta morbifica) жизненную силу кЪ бользненнымЬ противудьйствіямЪ возбуждающія. Большая часть изь нижесльдующихь причинь (но не всь) причиняють вредь чрезь раздраженіе.

e ned ide val in Af. 26. originalis is a

а) Теплота и стужа. Стольюци поча

Вышшая степень теллоты плотныя части разслабляеть, соки разширяеть и причиняеть временное полнокровіе (turgescentia). Естьли одна какаялибо часть тьла больше других вагрывается: то сосуды ея и соки больше разширяются и кровь приливается кы ней вы большемы количествь. Чрезы согрытіе кожи, кровь больше кы поверхности тыла устремляется, испарина умно-

жается и наконець дрлается поть. Сильный жарь чрезмврнымь раздраженіемь причиняеть боль и воспаленіе. Жарь кипящей воды и калильный, коснувшись канойлибо части, умерщвляеть ее внезапно и разрушаешь, да и все тьло умертвить онв можетв. Стужа плотныя части сжимаеть, соки стущаеть. Дриствуя на одну какуюлибо часть, сосуды ея спіягиваеть и ділаеть вы нихь обрашное теченіе крови. Когда кожа оть стужи сожмется: то дълается чрезв то препятствие крови втекать вь сосуды на поверхности тьла пресмыкающиеся, почему она и скопляется вь сосудахь поглубже находящихся. Высочайшая степень стужи плотныя части драветь окрыплыми и жидкости превращаеть вы ледь; а посему части. на которыя она подриствовала, умирають; что самое и совстмь трломь посльдовать отвнее можеть. Скоран леремена теплоты во стужу и стужи во теплоту есть чрезвичайно вредна.

· 140800 . 9. 27.

Мы разсуждаемь эдесь только обь

в) Воздухъ.

атмосферномь воздухь, вы которомы живемь. Сей воздухь можеть здълаться вреднымь различнымь образомь, поколику онь либо на легкое, коимь вдыхаешся, либо на кожу, и посредствомь сихь органовь на все прочее тьло дыйствуень. Антмосферной воздухв, жизненнаго воздуха мало вв себв имвющій, не довольно способень кь поддержанію жизненной силы. Естьлиже жизненнаго воздуха нимало вр немр не находится: то чрезв задушение умерщиляеть онв скоропостижно. Воздухв теллый и вливств влажный вредишь шьмь, чио легкое и кожу разслабляеть и тьло напоеваеть влажносшію. Теллый и сухой изсушаеть тьло. Холодный и влажный удерживаеть испарину. Холодный и сухій умножаєть чрезморно напряженность волоконь, сжимаеть сосуды и раздражаеть кожу. Можеть быть также вредныл вещества изв воздуха могушь входить вы шьло чрезь всасывающіе сосуды выкожы пресмыкающіеся. Различные евтры ко причинамо бользней причисляющся, поколику они вредной воздухь изь одной стороны переносять вы другую.

§. 28.

Сообразно двиствію, поторое теплота, стужа и другія свойства атмосферы надвинимь твломь производять, и по различію самой атмосферы, всякое время года имбеть нвкоторымь образомь собственныя свои бользни, которыя для того и называются бользнями зимними (m. hiemales), весенними (vernales), лътними (aestivi) и осънними (autumnales).

S. 29. "

с) Пища и литіе.

Сіи вещи, употребляемы будучи вы излишнемы количествь, растягиваюты желудокы, ослабляюты его сократимость и пренятствуюты червообразному его движенію (motus peristalticus) такь, что пищевареніе медленные вы немы совершается, яствы и питія долго задерживаются и портятся. Всякая пища и питье, кои пищеварительными силами человыка оныя употребляющаго трудно преобразуются и чрезы то вы кишечномы каналы долго задерживаясь портятся, могуты причинить различный вреды по различному ихы качеству.

Такимь образомь хислое часто употребляемо буду и, врединь півмь, что трудно сокамь человьческимь уподобляется и надлежащему смітенію питательнаго сока препятствуеть. Жирное разслабляеть и естьли порядочно вы желудкв не сваришся: то двлается промзтлымь. Клейкое пірудно разводиніся и питательный сокв двлаешь вязкимв. Сжимающее (adstringens) препятиствуеть изпражненію кала. Острое св лишкомв раздражаеть и можеть причинить остроту соковь. Разгорячающее умножаеть движеніе крови. Прохлаждающее умаляеть раздражимость. Однако вв разсужденіи качества пищи и питья много зависить отв темперамента, пищеварительныхв силь, здравія или бользни и отв привычки употребляющаго оныя. Между качествами вв пищу употребляемыхв вещей примъчать также должно теплоту и стужу. Теллое, пишье найпаче, разслабляеть. Холодное сжимаеть, раздража тв и вредить найпаче разгоряченному трлу.

§. 30.

d) Движение и локой.

Долговременное и безв отдыху продолжающееся движение мышиць истощеваеть нервную силу, утомляеть и наконець причиняеть обмороки. Отв сильнаго движенія мышиць кровь скорве обращается, разгорячается, вв большемь количествь кь правому пустырю сердца и кв легкому возвращается, дыханіе ускоряется и ділается одышка. Сильныя движенія, кои ежедневно безь довольнаго опідохновенія ньсколько разв повпюряются, пренятствують питанію и тьло дьлають тощимь потому, что питанію покой найбольше спосившествуеть, и что оть движенія дьйствіе всасывающихь сосудовь и испареніе кожи умножається. Отвизлишняго лохоя пишаніе свлишкомв умножается, кльтчетая плева дьлается чрезмірно жирною и соки получають водяное качество.

§. 31.

е) Лежаніе и стояніе.

Каждое положение трла, естьли оно для изврстных причино есть и полезное: но чрезв, долговременное единообразие свое дрлается наконець боль-

те или меньше вреднымв. Отв горизонтальнаго положенія вообще кровь вb голову и легкое притекаеть вь большемь количествь. Отв лежанія на слинь прижимающся сверхь того почки, большіе кровоносные сосуды, заднепроходная кишка и съменные пузырки. Отв лежанія на привомь боху правое легкое, печень и правая часть ободошной кишки; а отв лежанья на лесомв боху желудокв, селезенка, львая часть ободошной кишки прижимаются. Отв продолжительнаго стоянія умаляется притеченіе крови кв мозгу, отв чего, равно какв и оть сильнаго напряженія, котораго сіе положение шрла шребуеть, дрлается у новоторыхь, слабыхь найпаче, пошнота и обмороки. Больше же всего вредить долгевременное, при согбенномь найпаче вы переды туловищь сидъніе; поелику чрезв таковое положение двлается великое препятствіе обратному теченію крови изв бедрв и чревныхв внутренностей, вв системв найпаче ворошной жилы, заслоночекь не имьющей.

§. 32.

f) Conb n Gathie.

Долговременное бавніе весьма разслабляєть силу нервовь; поелику оно препяшствуєть возьобновленію силы сномь единственно вознаграждаємой, и шьло авлаєть сухимь; поелику питаніе во время сца лучте совершаєтся. Чрезмърной соло напрошивь того умножаєть тучность кавичетой плевы и душевныя силы принтупляєть.

for and spread of the 10 33.

g): Одвяніе.

Всякое плашье сжимающее півло и чрезь то обращенію крови, движенію мышечныхь волокопь и дбйствію внутренностей препятиствующее, бывасть вредно. Толстая также и півло плотно обремлющая одежда вредна потому, что она весьма грбеть, оть чего півло оть стужи отвыкшее прикосновеніе холоднаго воздуха труднье сносить и простуднымь бользнямь легко подвертается.

§. 34.

h) Различныя вещи механическим образомь авиствующия могуть быть вредными для твла твмв, что плотным части онв либо прижимають, либо раздавливають, сотрясають, разтягивають, разрывають, колють, отворяють сосуды и чрезь то причиняють изліянія крови, или другихь соковь, либо и умерщвляють нечаянно, повреждая части для жизненныхь двйствій нужныя, или причиняя сильныя кровотеченія.

····· \$ 35. years

і) Яды т. е. трла Химическимь образомь (и вь маломь количествь употребленныя) здоровому тірлу вредными бывающія. Острые чрезь раздраженіе могуть причинить воспаление и нагноеніе. Нікошорые изв числа тіхь, кои извыстны поды именемы жгулих (caustica), чрезвычайно сильно раздражають излишесывомь теплотворнаго вещества, отдрляемаго изв нихв во время прикосновенія оных вы органическому трлу, либо могушь даже и совершенно умертвить части ими прикасаемыя. Они могуть также причинить и повсемственную смерть всего трла, естьли отв нихв либо вся нервная система

чрезв сочувствие поражается, либо на части для жизни нужнвишия они двиствують. Оглушающие (пагсотіса) угнвышають нервную силу, умаляють чувствительность и противодвиствие нервной силы, причиняють безчувствие, смертной сонв и наконець смерть. Они могуть входить вы твло многими путями, какв-то: вы кишечной каналы могуть они войти чрезы роть, либо чрезы заднепроходное отверстие; вы легкое посредствомы вдыханія; могуть также сообщаться тьлу, приложены будучи свнаружи, либо чрезы рану.

9. 36.

Сюда принадлежать также яды особливаго свойства заразали (miasmata) называемые т. е. бользнетворныя вещества вь животномь тьль родившіяся, и изь коихь каждое производить особливую свою бользнь. Нькоторыя изь нихь изь одного животнаго тьла, вь которомь онь бользнь свою произжели, могуть переходить вь другое и вы немь причинить туже самую бользнь. Сіе сообщеніе называется прилилчивостью (contagium) и бользни, ком от в таковой заразы произшедши, подобным в образом в сообщаться могутв, именуются прилилиненми (contagiosi).

§. 37.

к) Изпражненія како ть, кои во здоровомь состояни совершаются, естьли онв либо задерживающся, либо бывають чрезмьрны: такь и пів, кои бользненно собершающся. Всь кровотеченія вредянь здоровому шьлу, умаляя важную и для поддержанія жизни необходимо нужную жидкость, безб довольнаго количества которой пібло ни своего здравія, ни кріности удержать не можеть, изключая шолько одно мвсячное кровошечение, которому женской ноль чрезь долгое время жизни своей подвержень, и которое служить кь умаленію отів времени до времени естіесщвеннаго полу сему многокровія. Сіе тпеченіе, остановлено будучи, причиняеть полнокровіе, накопленіе крови вь слабьйшихь часшяхь и бользненныя кровотеченія. Другихь также бользненных в кровошеченій осшановка, или прекращение, бываеть вреднымь, естьди твло чрезв частое, иногда періо-

дическимь образомь бывающее возвращение оныхв, взяло кв нимв привычку, а найпаче естьли остановление сие вв многокровномо пібль внезапно ділается. Излишняя потеря съмени истощеваеть силы нервовь и тьло изсушаеть. Задержание его едвали инако вредишь, какь чрезь дьйствіе похошьнія, которое тьло, ошь вліянія на него души, терпить. Водяныя и слизистыя теченія хотя не столько разслабляють, какв кровяныя: однако и онб, св лишкомв продолжаясь, дрлающся вредными, истощевая соки. Такимь же образомь вредишь частое и чрезмърное изпражнение низомь, соединенное св излишнимв опдвленіемь кишечнаго сока, оть чего каль мягче, либо и весьма жидкой изпражняется. Запорв напрошивь того причиняеть накопленіе, отвердініе, тнилость кала и подаеть поводь всасывающимь кишечнымь сосудамь вбирать вр себя вредныя частицы изронаго. Чрезмбрное отделение мочи уменьшаеть водяную часть крови и изсущаеть тьло. Чрезв уменьшение же сего отделения кровь ділаеніся водяною и чрезі нако-

ыленіе ві ней солей и горючихі веществь, извъстной порчь подвергается. При задержаніи мочи, мочевой пузырь растягивается, разслабляется, восналяется, либо наконець и разрывается. Долговременное задержание испарины вредно бываеть потому, что чрезь сіе накопляющся въ тьль льшучія соляныя, торючія и водяныя частицы, коихо излишество натура чрезв скважины кожи изпражинеть. Найбольше же вредно бываеть задержание пота, которое либо чрезв одно сочувствие, либо посредсивомь переносовь можешь причиняшь завалы, воспаленія внупіренностей, больэни чувственных жиль и скоропоснижную смершь.

, §. 38.

1) Душа самая можеть также, и противь воли своей, завлаться вредною для своего твла, чрезь авйствие страстей найпаче. Печаль, свтование, скорбь угнвтають силу чувственных жиль, ослабляють всь авйствия, разстроивають пищеварение, течение соковь умедляють, желчь вы сосудахы отавляющихы се задерживають и авлають ее темнонавтиною. Гивов, како будто скоропроходящее бышенство, возбуждаеть нервную силу св великою жестокостію такь, что отв сего следують насильственныя движенія сердца и артерій и кровь стремительное ко голово приливаешся; найпаче же побуждаеть онь орудіе желчи кі изобильнійшему ея отділенію и изліянію. Большеже всего вредишь пошаенной гивы, который корчевое состояніе во внутренностяхь, а найпаче въ желчной системъ, производишь. Страх причиняеть какь параличи, таквравно и корчи и корчевое дрожаніе. Ислугь наводишь внезапныя корчи, гонить кровь обрашно отв поверхности тьла ко внутреннимь частямь, дьлаеть бльдность лица и обмороки. Чрезмррное напряжение ума и долгопродолжиптельное глубокомысліе истощевающь также нервную силу такв, что пищевареніе и прочія твлесныя двиствія худо совершающся.

§. 39.

Епидемическія или повальных бользни (m. Epidemici) суть такія, кои вы одно время поражають многихы людей вы извъстной странъ живущихъ. Иногда переходять онъ изъ одной страны въ другую. Онъ произходять от причинъ на всъхъ, либо по крайней мъръ на многихъ извъстной страны жителей, въ одно и тоже время дъйствующихъ, от вреднаго качества воздуха, либо от общенародной въ томъ мъсть пищи, иногдаже от прилипчиваго свойства бользней.

§: 40.

Ендемическія или однонародныя бользни (т. Endemici) находятся также почти постоянно вы одной извыстной страны такь, что всегда можно найти не малое число жителей оной болынями сими страждущихь. Оны произходять оты извыстныхы причинь, которымы всы извыстной страны жители всегда суть подверженны, оты климата, рода пищи и питья и оты образа жизни.

Епидемическія и ендемическія болівни вообще зовутся пандемическими или всенародными (т. pandemici): однако онів не всіхів безів изъятія извістной етраны жителей поражають; ибо нькоторые изь нихь, не имья вь себь преклонности (безь которой случайныя причины никакой бользни причинить не могуть), подвержены онымь не бывають.

§ . 42.

Отв пандемических бользней отличать должно Спорадическія или частныя (т. sporadici), кои случаются вы каждомы особо тойже стороны житель.

§. 43.

Ближайшія, собственно так называемыя причины бользней (§. 16.) суть извъстныя, от здоровья уклоняющіяся, самаго человьческаго тьла свойства, от коих произходять бользни. По чему сіи самыя причины и суть дъйствительно бользни; причинами же называются онь, поколику производять бользни.

5. 44.

Причина множайших в болваней состоить вы жизненной силь; либо

- 1) весьма сильно, либо
- 2) весьма слабо, либо
- 3) непорядочно дрисшвующей.

Болбэни перваго рода называющся болбэнями св умноженною жизненною силою сопряженными (m. sthenici); втораго рода болбэнями отв умаленной жизненной силы произходящими (m. asthenici); третьяго же рода болбэни можно свойственно назвать безпорядочными (m. atacti), или произходящими отв жизненной силы безпорядочно двиствующей.

Сверхъ того, находятся еще и другія ближайшія причины бользней, которыя суть весьма различны. Мы вычислимь здёсь изъ нихъ ть только, кои суть больше извёстны и больше опредёлены, а именно :

9. 45.

т) Окраплость плотных в частей чрезмьрная (rigiditas nimia), произходящая т. е. либо а) отв того, естьли вы вы тыть земляных в частиць, и слыдовательно волокнистаго вещества излишество, а клея и воды недостаток в находится, либо в) естьли частицы волоконы одна сы другою крытко связаны.

Причинами сего состоянія сущь: глубокая старость (мужеской поль); чрезмірная испарина; холодной и сухой климать; холодныя ванны; земляная, холодная, волокна стягивающая пища; хмітьные напитки; літкарства сжимающія (styptica).

· §. 46.

Сія бользненная окрыплость бываеть также и мыстная (rigiditas topica).

Причинами ея бывають: скопленіе земляных вчастиць вы извыстной какойлибо части тыла; мыстная холодная баня; мыстное употребленіе сжимающихы лыкарствы.

8. 47.

2) Слабкость или сллость чрезмврная (laxitas nimia) произходящая т.е. либо а) от втого, естьли великое количество клея и воды вы тыль находится, либо b) естьли частицы волоконы слабо между собою соединены.

Причинами сего суть: двтской возрасть; женской поль; тучность (которая выпрочемь и сама есть двйствіе слабкости); тепло-влажной климать; теплыя ванны; водяныя, жирныя и теп-



лыя яствы и пишья; лѣкарства разслабляющія; излишній покой; умаленіе испарины; кровотеченія.

§. 48.

Сія бользненная слабкость бываеть также и мвстная (laxitas topica).

Причины: накопленіе воды во извосшной какойлибо часши тола; мостная теплая баня; локарства разслабляющія на одно какіялибо части дойствующія; раздавленіе; потрясеніе.

§. 49.

3) Крвлость плотных частей чрезмврная (robur nimium, valetudo athletica).

Причины: возрасть составляющій средину (status) между юношествомь и старостію (ибо вь семь возрасть таковая крьпость очень удобно дьлается); мужественный возрасть; крьпкой темпераменть; насльдственная преклонность; пища пищательная вь довольномь количествь употребляемая и хорошо вь желудкь свариваемая; родь жизни, вь которомь тьло вь довольномь движеніи находится.

§. 50.

4) Разслабленіє плошных в частей (atonia).



Симъ именемъ означается собственно недостатовъ упругости (tonus). Хотя нъкоторые считають его за одно съ слабкостію (laxitas): но разслабленіе можеть быть какъ при чрезмърной окръплости, такъ и при чрезмърной слабкости. Слъдовательно и причины его суть тъже, кои и въ произведенію слабкости и окръплости споспътествують (§ 45 - 48).

§. 51.

5) Чрезмърная раздражимость (irritabilitas nimia).

Причины: раздражительной темпераменть; сухой воздухь; воздухь пресыщенный кислотворнымь веществомь; пища изь царства животныхь сь пряностями приготовленная; винные напитки.

§. 52. altante frais

6) Умаленная раздражимость (irritabilitas imminuta).

Причины: Темпераменть мало-раз-Аражительной; воздухь влажный; воздухь имьющій вь себь мало кислотворнаго вещества; пища растительная, водяная, слизистая, мучная и молочная.

§. 53.

7) Урезмърная чувствительность (sensilitas nimia).

Причины: дѣтской возрасшь; климать теплой; чрезмѣрное бдѣніе; излишнее напряженіе ума; страсти вь сильномь желаніи состоящія.

§. 54.

8) Умаленная чувствительность (sensilitas imminuta).

Причины: старость; холодной климать; пища водяная, слизистая, мучная; сонь чрезмърной; яды оглушающіе (narcotica).

§ 55.

9) Чрезмърное и жестокое жизненной силы адистве.

Причины: чрезмърная сила напряженности (tonus) или жизненной силы; возрасть юношеской; достаточное питаніе тьла; пища изь царства животныхі; яствы пряныя; винные напитки; лькарства ободряющія (analeptica); излишество крови; любовь; честолюбіе; гньвь.

10) Умаленное жизненной силы Авйствіе (languor).

Причины: умаленная сила напряженности или жизненной силы; старость гл. бокая; питаніе скудное; пища безвкусная; кровошеченія; потеря съмени; вст изпражненія излитнія; яды оглушающіе; заразы гнилыя; печаль.

11) Умноженное леижение крови.

Причины: умноженное жизненной силы двиствіе; умноженное количество, либо только разширяемость (volumen) крови; раздраженія сильныя; воздухв теплой; пища изв царства животныхв св приностями приготовленная; винные напитки; лвкарства разгорячающія; движенія сильныя; бдвніе; честолюбіе; любовь; гнвывь

§. 58.

12) Умаленное движение крови.

Причины: умаленное жизненной силы арйствіе; умаленное количество крови; водяное качество крови; пища безвкусная; водяные напитки; лъкарства прожлаждающія, оглушающія; покой; сонь; печаль.

9. 59.

13) Остановление соховь и произходящий отв того заваль сосудовь.

Причины: окрвплость, или и слабкость сосудовь; умаленная раздражимость; глубокая старость; морозь; пища клейкая; элоупотребленіе хмвльныхв напитковь; излишній покой; жизнь сидячая; одвяніе твеное; раздавливаніе; потрясеніе; нвкоторыя бользнетворныя заразы; печаль.

506.60.

14) Многокровів (plethora) т. е. чрез-

Оно разавляется

I. Hambert Engre die den agent

а) Истинное (pl. vera, pl. ad massam), естьли т. е. крови излишнее количество накодитея.

Причинь его суть: юношеской возрасть; женской поль; пища многопитательная; покой излишній; задержаніе натуральнаго, или вы привычку прешедшаго кровотеченія; слабкость сосудовь.

b) Ложное (pl. spuria) произходящее т. е. aa) Отъ разширяемости крови (pl. ad volumen).

Причины: воздухb теплой; напитки теплые, хибльные; лькарства горячи-

тельныя; вст причины движенія крови умноженняго (§. 57.). В причины движенія крови

bb) Отв недостатка пространства вв кровоносных в сосудахв (pl. ad spatium, ad vasa).

Причинами суть, либо великая окръплость, либо сильная напряженность (tonus), либо корчевое сжатие сосудовь.

сс) Отъ нелостатка крълости силь потребной къ перенесенію наллежащаго количества крови (pl. ad vires).

Послѣдніе два роды полнокровія (pl. ad spatium et ad vires) можно также назвать относительнымь (pl. relativa), и напротивь того два первые (pl. vera et ad volumen) совершеннымь (pl. absoluta) многокровіемь.

а Повсемственное (pl. universalis), которое во всемь тьль; я

b) Мъстное (pl. partialis), которое только во одной, либо во другой части тола находится.

Причины: мъстная слабность; разаражение одной какойлибо части; глубокое какойлибо части положение; прижатие сосудовъ соки возпращающихъ-

\$. 161.14 PO 14 14 14 14 14

15) Малокровів (keneangia) т. е. такое состояніе, въ которомь мало крови находится, и потому кровоносные сосуды не довольно полны.

Причины: старость глубокая; недостатоко пищи; пища мало питающая; кровошеченія и другія чрезморныя изпражненія; худое пищевареніе.

5. 62.

- 16) Бользненное качество крови и других соков, которое вы разныхы случаяхы бываеты различно. Ныкоторые вовсе не пріемлють сего: но не справедливо. При внимательный шемы и непредыубыжденномы, ныкоторыхы явленій наблюденіи не можно сомнываться, чтобы и качество соковы не было ближайшею причиною многихы бользней, котя я охотно соглашаюсь на то, что оно большею частію бываеты послыдствіемы бользненнаго качества плотныхы частей.
 - а) Вода.
- ная влажность.

Причины: воздух b холодно - влажной; пища и пишье водяныя; покой излиш-

ній; отділеніе мочи, или испарины ўмаленное разі якую (1804 эт

bb) Недостаток оной, или сухость.

Причины: воздухв теплой сухой; пища сухая; напитки цвльные; движеніе частое и сильное; излишнее отдвленіе мочи или испарины:

b) Кислотворное вещество (oxygenium).

Причины: воздухв жизненнымв гасомв изобилующій; пища кисловатая (?); частое движеніе и известный образв двиствія жизненной силы.

· : bb) He nocmamond onaro. The and will of

Причины: воздух в содержащій в в себь мало жизненнаго гаса; пиша изв царства живошных в; недосшатов в пищи растительной; чрезмърной повой и извъстный образь дриствія жизненной силы; что виноваю членнам

- с) Горючія вещества, фосфорь (сбра) угольное вещество, водотворное вещество; от стано выплания в с
 - аа) Излишество опыхв.

Причины: Пища и пишье вещества сіи во множествь вь себь содержащія; мясо; сырь; яйцы; жирь; пизо крыпкое;

вино кръпкое; кофе и проч. лъкарства таковагожь рода; съра и проч. умаленное отдъление мочи; умаление испарины; извъстный образь дъйствия жизненной силы.

вы) Нелостаток оныхв.

Причины: пища и напитки водяные; воздержаніе отв пищи и питья вещества сіи во множествь вы себь имьющихь; извыстной образь дыйствія жизненной силы.

т. d) Щелочная острота соховь. · · · ·)

Причины: употребленіе щелочных **b** тьль; извъстный образь дьйствія жизненьой силы.

е) Кислая острота соховь

Причины: Частое, изобильное употреблечие кислых вещей; извъстный образь дъйствия жизненной силы, а найпаче слабость оной, чрезь которую пица и питье, къ тому наклонныя, въ желудкъ окисають, а дъйствительно - кислыя сокамъ не уподобляются.

f) Средні - соляная острота соковь.

Причини: Частое, изобильное употребление соленой пищи; извъстный образь дыйствія жизненной силы.

д) Бользненное качество соковь происходлщее оть худо - приготовленнаго, или несовершенно уподобленнаго питательнаго сока.

Причины: пища и питье не удобоваримыя, особливо же ть, кои св нашими соками весьма не сходствують; слабость жизненной силы, вв которомь состоянии будучи, не можеть она довольно споствшествовать ни варенію пищи вв желудкь, ни питательнаго сожа уподобленію.

h) Боль ненное качество соковь происходягцее оть прилипчивости.

Причиною сего есть прилипчивость (§. 36.).

§. 63.

17) Нечистоты лервых в лутей.

Подр симр именемр разумфемь мы

- а. Несваренную лищу и литье, кои оставаясь въ желудкъ либо въ кишкахъ, испортилися:
- b. Каль, который задержань будучи вы кишкахы, испортился, отвердыль, или загнился, или загнился, или загнился.

какимвлибо образомв болвзненною здвлавшуюся.

d. Желчь либо вв великомв количествв отделенную, либо бользненную, густую, клейкую, зеленую, черную, мутную, острую, гнилую. Сюда принадлежить также и та желчь, которая вв желчномв еще пузырв содержится и вв кишки еще не излилась, и которая можетв либо быть вв излишествв, либо бользненное имьть качество.

Причины, ошь коихь дьйствія произжодять нечистоты сій, суть весьма различны:

а) Причины нечистоть перваго рода (§. 63. а.); разслабленіе желудка и кишекв; слабое двисшвіе жизненной силы; соки пищеварительные худые; излишнее употребленіе пищи и пишья; употребленіе неудобоваримой, либо кв порчв премлонной пищи; злоупотребленіе теплато водянаго пишья; злоупотребленіе хивльных в напитков в злоупотребленіе хивльных в напитков з настое приниманіе рвотных в проносных в лькарствы; сидвніе; одвяніе брюхо ственяющее; чрезмірное напряженіе ума; печаль; гновь.

- 1) Причины нечистоть втораго рода' §. 63.b.): слабость китекь; желчь бездьйственная; пища оставляющая по сеть много нечистоты; водка; красное вино; лыкарства сжимающія; слабительныя часто употребляемыя; сидьніе; одьяніе брюхо сжимающее; беременность; чрезмьрное напряженіе ума; печаль.
- с) Причины нечистоть третьяго рода (§. 63. с.): слабость кишечнаго канала; частое употребление острой, жирной пищи; питья водяныя, теплыя; нечистоты острыя; жизнь сидячая.
- d) Причины нечистото четвертого рода (§. 63. d.): завалы во печени и во селезенко; слабость печени; умноженное или умаленное дойствие жизненной силы; извостныя вредныя качества атмосферы; печаль; гново; ужась.

§. 64.

Бользни произходящія от нечистоть первых путей бользиями желудочными (т. gastrici) называются.

TAABA TPETIA.

О припадкахь.

§. 65.

Подв именемь припадков разумьемь мы дьйствія бользней чувствамь подверженныя. Нькоторые извних суть непріятныя чувствованія однимь полько больнымь ощущаемыя. Многіе же примьтить можно зрыніємь и осязаніемь, а частію слухомь и обоняніемь больнаго и другихь людей.

§. 66.

Нѣкоторые припадки извѣстной какойлибо бользни суть ей существенные (esfentialia, pathognomonica), которые то е вы каждомы человых извѣстною бользнію страждущемы находятся. Другіе же случайные (accidentalia, fortuita), которые у нѣкоторыхы только, а не у всыхы, тоже бользнію страждущихы людей бывають.

§. 67.

Павологи различають также припадки лричинь, припадки бользни и припадки лрипадковь.

§. 68.

Коренныя бользин (m. idiopathici) суть тв, коихв ближайшая причина вв той самой части находится, гдв и припадки оказываются. Сочувственныя (m. sympathici, consenfuales) напротивь того суть тв, коихв ближайшая причина не вв той самой части, гдв припадки, но гдвлибо индв находится.

§. 69.

Мы замьшимь завсь вообще главньйшіе припадки бользней, и вопервыхь корчу (spasmus) п. е. бользненное сокращение волоконь раздражимостию одаренныхв, произходящее отв бользненной раздражимости коренной, либо чрезь сочувствие вы нихь возбуждаемой. Корчи лостоянныя или скорченія (spasmi tonici) сушь такія мышечных волоконь сокращенія, кои безв послабленія продолжаются. Корчи непостоянныя или су-Aoporu (spasmi clonici, convulsiones) cymb скоропроходящія корчи бывающія поперемьню срослабленіемь волоконь. Многіе припадки бользней супь корчеваго свойсшва, хошя они не причисляющся

кв корчамв, собственно такв на-

S. 70.

Важной припадокь есть бользненное жилобіеніе (pulsus) т. е. сжиманіе и разширеніе (systole et diastole) аршерій. Последнее (diastole) происходишь отв сжиманія (systole) сердца, а посему сжиманіе сердца можно примьшинь вь разширяемости артерій, и поразличію оной различные роды пульса поимянно между собою отличаются. По сей причинь подв именемв пульса вв твсномв смысль обыкновенно разумьется разширяемость біющихся жиль. Здоровой пульсь есть довольно великой, мягкой, равномърной, ни чрезмърно частой, ни скорой. Бользненной же многоразличным в образом в оть онаго уклоняется. Онь бываеть лолной (plenus) или малой (parvus, vacuus); твердой или мягкой (durus, vel mollis); частой или радкой (frequens, vel rarus); скорой или ме дленной (celer, vel tardus); меривной inaequalis) различнымь образомь: перемежающійся (intermittens), удвояющій (dycrotus), зыблющійся или воздымающійся и упадающій (inciduus) и проч.

Отв сильнаго жизненной силы противодвиствія двлается пульсв полной, твердой; отв слабаго же малой, мягкой. Различныя раздраженія двлають его твердымь, частымь, скорымь, неравнымь. При умаленной раздражимости бываеть онь меньше, мягче, рвже, медленнье.

§. 71.

Сердце самое быется иногда св судорожною жестокостю, либо отв раздраженія кореннаго или чрезв сочувствіе на него двиствующаго; либо отв препятствія кровообращенію на пути встрвчающагося, которое оно преодольть силится. Сіе обыкновенно называють біснісль сердца (palpitatio cordis).

§. 72.

Теплота здоровато трла есть умъренная и по всему трлу равномърно раздъленная. Въ бользняхъ не ръдко она корчевымъ образомъ умножается, или перемъняется. Многія бользни начинаются бользненнымъ озноболь въ жаръ перемъняющимся. Часто также больные имъютъ жаръ неј авномърной такв, что голова, руки и проч. бывають горячи; ноги же и проч. холодны, что происходить от неравномърнаго вліянія крови, или от неравномърнаго двиствія нервовь вь от двленіи теплотворнаго вещества.

§. 73.

Кв главнымь и важнымь припадкамь принадлежать кровотеченія, которыя происходять либо оть разширенія сосудовь изпаряющихь, либо оть раны вь кровоносномь сосудь причиненной.

9. 74.

Здоровое дыханіе совершается легко, медлительно, тихо, равномірно и довольно глубоко. Болізненное уклоняется отв онаго различнымі образомі. Оно бываеть тяжелое, сильное, скорое, неравное, короткое, очень глубокое, что произходить либо отв раздраженія ві орудіяхь дыханія коренных или чрезі сочувствіе на оныя дійствующихь; либо оть препятствій дыханія; либо оть ускореннаго кровообращенія. Кашель (tusis) есть жестокое, судорожное издыханіе, которое сь сжатіемь глотки (rima glottidis) совершается и за глубо-

кимь вдыханіемь следуеть. Онь произходить отвераздраженія кореннаго, или чрезв сочувствіе на дыхательное горло и на въшви его (bronchia) дъйствующаго. Уиханіе (sternutatio) есть жестокое, судорожное издыханіе безв сжащія глошки совершающееся и посль глубокаго вдыханія сльдующее. Оно произходить оть кореннаго, или сочувственнаго носовой плевы раздраженія. Икота (fingultus) есть скоропостижное вдыханіе произходящее отв судорожнаго состоянія грудобрющной преграды сжимающей вмвств и пищепріемное горло. Воздыхание (fuspirium) есть тлубокое вдыханіе, естественнымь побужденіемь, для прогнанія крови вь легкомь накопляющейся, производимое. Одышка (anhelitus) есть частое дыханіе, которое при скорбишемь движеніи крови необходимымь дьлается.

§. 75.

Система нересей во многих вользняхв, вы на выпорых в преимущественно, поражается. На воторыя бользни оказывають жудое дайствие на чувствительность, от чего произходящь различнаго рода боли, бывающія частію коренными, а частію сочувственными. Другія возбуждають жизненную силу кь чрезмірному противодійствію, причиняють хорчи, судороги раздражительных волоконь. Иныя же истощевають или угнітають жизненную силу, откуда произходять неловоротливость (languor), усталость (lassitudo), болізненной глубокой сонд (fopor), лараличь (paralysis), облюрохд (lipothymia, fyncope) облираніг (asphyxia).

§. 76.

Когда нервная система страждеть: то состраждеть ей больше или меньше и луша вы півсной сы нею связи находящаяся. Отсюда произходить лечаль, сытованіг, и, естьли чувствилище (fenforium) вы большей степени страждеть: то дылается бредь (delirium) либо тихой, безпамятной (del. ftupidum), естьли т. е. мозгы угнытается; либо буйной, сы бышенствомы соединенной (del. ferox), естьли мозгы весьма сильно раздражается.

§. 77.

Когда вибшиня или внутреннія чувства во болозняхо поражаются, либо органы ихо перемоняются; то впечатловають оно душь ложных понятія, либо и совсомо прекращають свое дойствіе во сообщеніи ей понятій состоящее.

Въ премногихъ повсемственныхъ бользняхъ мышицы отъ воли зависящія бывають слабье, движутся съ трудностію и принужденіемь, по причинь чувоственножильной силы угньтенной или истощенной: но находятся также бользни, въ коихъ безъ воли души, либо и противъ воли ея, корчевыя движенія въ мышицахъ, иногда съ великою силою и жестокостію, производятся.

Сонд во многих вользнях разстроивается, либо и совство не бываеть, от раздраженія чувствилища причиняемаго болью какоюлибо, корчами, тоскою, жаромь, устремленіем крови кы головь. Другія бользни напротивь тото наводять великую преклонность ко сну, либо и бользненной глубокой сонь (fopor).

§. 80.

Желудоко и кишки различные вы бользняхы претерпывають припадки, а именно: вытры, оты воздуха изы несварившейся пищи, питья и другихы нечистоть опідыляемаго и потомь, по причинь слабости, либо корчеваго вы кишечномы каналь состоянія, вы ономы задерживаемаго; боль желудка (cardialgia); боль вы кишкахы (colica); тошноту (naufea); реоту (vomitus); поносы (diarrhaea) недостатокы позыва на вду (anorexia).

§. 81.

Изпражнение различных в нечистот рвотою либо поносомв, принадлежитв также кв припадкамв бользней.

J. 82.

Вы разсуждении питанія достойный примічанія припадокі есть сухотка (тагсог) при конці всіхі почти повсемственных долгопродолжительных і болізней приключающаяся, ві нікоторыхі же изі оныхі и сі самаго начала, и даже прежде другихі припадкові оказывающаяся. Таковая сухотка бываеті также и вь одной какойлибо части тьла (marcor partialis).

9. 83.

Отавление мочи вв некоторыхь бользняхь бываеть умножено, а вы нькоторых в умалено. Качество мочи вв бользняхь бываеть многоразлично. Здоровая, свъжая моча есть севтлая, водяная, желтая и солоновата, носколько кислована и издаеть запахь слабой, неотвратительной. Изврстнритія лороды бользненной мочи сушь: 1) моча содяная, безцвішная, оші чрезмірнаго количества воды во крови, или ото корчеваго почекь состоянія, отдыленіямь горючих (красящих) вещество препятспівующаго. 2) моча весьма желтая, огнецвишная, от великаго количества торючих веществь т. е. фосфора, угольнаго вещества во крови, либо отв изобильнаго отделенія оныхв, отв сильнаго движенія и умноженной теплоты крови. 3) моча мутная, когда волокнистое вещество, во всякой здоровой мочь содержащееся, не хорошо сь нею смьшано, по причинь бользненнаго качества крови, или почекв.

1345041 0. 17. . § . 84.

Покровы тела (т. е. кожа) служать мвстопребываніемь различных в при падковь. Умноженную теплоту и бользненную стужу како больной само, тако найпаче врачь, вы кожь чувствують. Вы нькоторыхь бользняхь, гдь по причинь корчеваго потовых скважинь состоянія изпареніе задерживается, поверхность кожи бываеть суха и жестка; вв друхих же, гдв испареніе умножено, бываеть она влажною. Вышшая спіспень сего состоянія извістна поді именемь лота (sudor), который бываеть либо а) теплой и изпаряющій (halituosus), естьли св разширеніемь потовых вскважинь, умноженное движение крови соединено; либо b) холодной, и иногда клейкой, когда произходить онь единственно отвразслабленных в и бездриственных в (paralysis) скважинь оныхь.

§. 85.

- Между припадками кожи примвчать должно найначе различныя сыли (exanthemata), какв то: лятна (maculae) красныя, синеватыя, желтыя, разноцввтныя; лрыщи (papulae); лузырки (vesiculae);

пулыришки (pustulae); струпья (escharae) и проч. кои происходять либо оть внышней какойлибо причины непосредственно (idiopath.) на кожу подъйствовавшей; либо оть внутренной (sympath.) бользненную матерію чрезь сочувствіе ей сообщившей (metastasis). Вь нькоторыхь бользняхь верхняя кожица (epidermis), либо Малпигієва слизь, различнымь образомь перемьняется.

§. 86.

Анце вь бользняхь различнымь образомы измынается. Вы множайшихы повсемственныхы бользняхы бываеть оно бльднымы и глаза теряють свой блескы, оты умаленнаго дыйствія чувственныхы жилы и слабаго вліянія крови вы кровоносные сосуды лица. Когда же напротивы того кровь сы большею стремительностію кы головы притекаеть: то лице дылается краснымы и надутымы, а глаза сверкающими. Оты слабости нервной системы дылаются извыстные оные синеватые поды глазами кружки,

ТЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ОбЪ окончаніи бользней.

· §. 87.

Охончаніе больни бываеть тролкое т. е. больной или 1) выздоравливаеть, или 2) умираеть, или 3) бользнь одна переходить вы другую.

§. 88.

Вь премногихь бользняхь жизненная сила живаго тыла старается чрезь совокупное чувственныхь жиль и раздражительныхь волоконь, либо и чрезь однихь сихь волоконь противодьйствіе, бользнетворное вещество изь тыла изгнать и бользнь изльчить. Естьли она таковое дьйствіе оказываеть: то называють сіе льчебною силою природы (vis naturae medicatrix).

\$. 39.

Сія сила сама собою, либо сі помощію искуства, многія болівни совсімь изтребляєть и здравіє паки возстановляєть.

§. 90.

Но не каждая бользнь имъеть сіе счастливое окончаніе. Часто бользнь бываеть такь сильная, что жизненная сила, и при хорошомь пособіи искуственныхь средствь, преодольть ее не можеть. Жизненная сила также вы ныкоторыхь случаяхь дыйствуеть либо очень сильно, либо слабо, либо совсымь превратнымь и вреднымь образомь. Наконець находятся бользни, кои по существу своему суть неизлючимы.

§. 91.

Такимъ образомъ продолжаются нъкоторыя бользни даже до смерти, которая потомъ причиняется другими причинами, хотя причины сіи самы собою и не умерщеляють больнаго.

§. 92.

Другія напрошивь шого причины умерщеляють сами собою либо і) жизненную силу изтощевая или угньшая, либо 2) органы кы поддержанію жизни служащіе поражая такь, что они долье дыствовать не могуть.

§. 93.

Бользнь сама собою смерть причиняющая называется слертельною (lethalis). Никакой бользни смершельною безьошибочно назвать нельзя прежде, нежели она причинила смерть, либо по крайней мъръ прежде явственныхъ признаковъ предстоящей смерти. Таковая бользнь бываеть или 1) сама собою смертельная (per se lethalis), или 2) случайно - смертельная (per accidens lethalis). Сама собою смертельная бываеть потомь либо а) неизбъжно-смертельная (absolute lethalis), либо b) не неизбъжно - смертельная (non absolute lethalis).

\$. 94.

Опасными или элыми (maligni) бользни называются ть, кои либо смертію, либо другими важными, вредными посльдствіями угрожають. Нькоторыя изь нихь сь самаго начала своего таковую опасность вь себь уже изьявляють; а другія, элыми собственно назыбаемыя, вь началь своемь тихими и безьопасными быть кажутся.

§ 95.

Часто одна бользнь переходить вы другую такь, чио по прекращоніи первой, слыдуеть новая, первою произведенная.

§. 96.

но бывають случаи, гдь одна бользнь присосокупляется кы другой, и первоначальная при всемы томы не прекращается, что дылается либо і) такы, что новая бользнь бываеты произведеніемы старой, либо 2) оны обы не имыють между собою никакой связи и каждая изы нихы имыеть особливую свою причину.

§. 97.

Отсюда явствуеть, какь различаются между собою бользни преемственным (succedentes) и привниходящія (accedentes), выразсужденій предшедшей бользни либо прекращающейся, либо продолжающейся.

§. 98.

Естьли одна бользнь сльдуеть за Аругою, либо присовокупляется кы ней (§. 95. 96.) такь, что новая бываеть произведеніемы старой: то преждебывшая вы тьль лервоначальною (ргтаrius), а вновь привнишедшая последственною (secundarius) называются.

\$. 99.

Окончаніе бользни называется также переломомь (crisis s. iudicatio) оной, и потому раздъляють его на 1) хорошой (cr. bona) и 2) худой переломь (cr. mala).

§. 100.

Подв именемв перелома (crisis) вв обыкновенномо смысль разумьется преимущественно переломь хорошой (crisis bona), такой т. е. которымо бользны кончится совершенно (morbus solvitur). Хорошой переломо вомногихо бользняхь совершается чрезв изврсиное изпражненіе, которое по сей причинь и зовется лереломнымь. Чрезь таковое изпражненіе бользнетворная матерія вы тьль находящаяся и болбэнь причиняющая часто явственно изпражняется: но сіе не от всякаго переломнаго изпражненія бываеть; ибо оно часто произходить единственно оть дьйствія жизненной силы противод вйствующей, которая, хотя бользненную перемьну твла и изтребляеть: но бользнетворнаго вещества совстмо не изпражняеть.

§. 101.

Переломныя изпражненія совершаются различными путями. Переломныя кровотеченіл бывающія чрезв носв, чрезв двигородныя женскія части и чрезв почечуйныя жилы умаляють повсемственное и містное полнокровіе, лихорадку отв жизненной силы умноженной произшедшую, воспаленія, накопленія крови ві голові, ві легкомі, ві маткі и ві системі воротной жилы.

§. 102.

Чрезь переломной пото нервдко изпражняется бользнетворная матерія во крови содержавшаяся. Но иногда бываеть онь только последствіемь послабленія корчеваго во скважинах кожи состоянія, естьли при немь сильное стремленіе крови продолжается.

§. 103.

Изобильное отделение мочи можеть изпразнить излишнюю воду. Моча переломною называемая бываеть вообще свытлая и только вы довольно - глубокомы сосудь оказываеть плавающее скопление плотныхы своихы частиць

въ видъ облачка, которое мало по малу осъдаеть ко дну сосуда.

9. 104.

Переломная рвота очищаеть желудокь, двенатцатидюймовую кишку и желчный пузырекь; извергаеть излишноупотребленную, несварившуюся, испорченную пищу, бользненную слизь и желчь; иногда же ослабляеть корчевое состояние желчныхь протоковь, препятствовавшее изливаться желчь изь пузырка ея.

§. 105.

Переломный лонось очищаеть кишечной каналь, изпражняя различныя нечистоты онаго. Чрезь рвоту и понось изтребляются желудочныя бользни.

§. 106.

Слюнотечение рвд о примвчается переломнымв, котя ньтв вв томв сомньня, что чрезв жельзы слюну отдыляющия вредныя частицы изв крови выводимы быть могутв.

§. 107.

Умноженное отделение слизи вы дыхащельномы горлы и извержение оной чрезв переломную харкотину (sputa critica) изтребляеть извыстныя бользни возпалительныя и простудныя засоренія легкаго.

§. 108.

Припадки, съ коими слъдуеть переломы (хорошой), называющен лереломными или сласительными (symptomata critica s. salutaria). Поелику не всъ припадки бользней суть сего рода: то нъкоторые изъ нихъ и суть безполезные, вредные, опасные. Тъ даже самые, кои иногда бывають переломными, не всегда и не вездъ таковыми бывають, да естьли они и дъйствительно бывають переломными: то дълаются иногда вредными, естьли они сълишкомъ сильны.

§. 109.

Для переломнаго какойлибо бользненной машеріи изпражненія, за нужное почищають, чтобы она предварительно извъстнымь образомь здълалась къ тому приуготовленною или, какъ говорять, сваренною (coctio), дабы чрезъ то сырая какъбы еще матерія (materia cruda) здълалась способною къ изпражненію. На семь основывается раздъленіе періодово бользни на періодо і) сыраго состоянія (cruditas) 2) свариванія (coctio) и 3) переломнаго изпражненія (crisis, evacuatio critica).

§. 110.

Хорошой переломь бываеть либо совершенной (crisis perfecta), либо несовершенной (crisis imperfecta). Совершенной переломь бользнь совершенно изпребляеть; несовершенный же либо оставляеть чтолибо изь бользни истребляемой онымь, либо дълается такь, что посля сей бользни сльдуеть другая, не столь важная.

§. 111.

Квнесовершеннымв переломамв принадлежить переносв (metastatis), двиствіе натуры, чрезь которое повсемственная бользнь твла истребляется, произведши по себь мвстную. Такимв образомв произходять различныя мвстныя бользни, какв то: застой, заваль, воспаленіе, гнойной нарывв, водяная бользнь, сыпи и проч. Кажется, по крайней мврв вв нвкоторыхв изв сихв случаевь, что бользненная мате-

рія изв всего твла вв одну извістную часть онаго собирается.

§. 112.

Переносомъ называющь также и то, естьли мъстная бользнь, оставивь часть, въ коей она до того времени была, переходить въ другую.

§. 113.21. 1 d. 12

Дриствіе, посредством котораго ві болівненном тілі здравіє возстановляєтся, называется изліченіелів (sanatio). Оно есть дійствіє либо одной натуры т. е. жизненной силы ві болівняхі противодійствующей; либо вмість и врачебнаго искуства.

§. 114.

Вь разсуждении излъчения, бользни раздъляющся на излъчимыя (sanabiles) и не-излъчимыя (insanabiles). Но сего различия нельзя приспособищь ко всъмь и кы каждой породнь бользни; поелику не всъхь бользней свойство мы знаемь, хошя врачь при нъкоторых изъ нихы и имъеть причину жаловаться, что излъчить ихъ не можеть.

ГЛАВА ПЯТАЯ

О прохожденіи бользней.

§. 115.

нъкоторыя бользни продолжающся чрезь крашкое только время, кончаясь между тьмь скоро либо излъченіемь, либо смершію, либо прехожденіемь вы другую бользнь. Другія напрошивь того долговременно вы тьль остающся. Первыя изы нихы зовущся хратковременными (breves), а посльднія долговременными (diuturni s. chronici). Но какы понящія о кратковременности и долговременности бользней суть относительныя: то поды именемы кратковременныхы разумыемы мы обыкновенно, по произволенію нашему, ть бользни, которыя не больше одного мьсяца продолжающся.

§. 116.

Кратковременныя бользии называются также от в нькоторых в острыми (acuti), тогда найтаче, естьми онь притом в жестоки и опасны. Весьма острыми (acutisfimi) именуются ть, кои вы течении немногихы дией умер-

щвляють, либо хорошимь переломомь уничтожаются.

§- 117.

Во всякой бользни порознь различающь начало, приращение, высочайшую стелень; а вы півхь, кои перемыняющся опящь вы здравіе, прибавляющь еще умаленіе.

§. 118.

Начало (initium) нъкоторых вользней постигаеть вдругь, нечаянно. Другія внъдряются постепенно, либо даже столь медленно, что времени начала их вопредълить бываеть почти невозможно. Таким вобразом вывають также бользни, вы коих вразличные легчайтіе припадки, как предесстники (prodromi) настоящей бользни предшествують.

§. 119.

Бользнь начавшись, возрастаеть (incrementum) потомь такь, что частію припадки ея ожесточаются, а частію новые присовокупляются.

§. 120.

Когда бользнь достигла найбольшей своей силы: то сіе называется емсочайшею степенью (status, acme) оной. За симь слъдуень пономь переломь (§. 99.).

§. 121.

Вь новы причинь вы изывающим деломы по сей причинь и называющим лереломимыми (dies critici).

§. 122.

Естьли потомы натура излычиваеть бользнь либо сама собою, либо сы помощію искуства: то высочайтая стенень бользни переходить вь умаленіе (decrementum), вы которомы припадки и вы силь и вы количествь своемы постепенно умаляются.

§. 123.

Различные періоды бользней вы острыхы найпаче бользняхы различить можно. Сіи бользни большею частію имыють извыстное правильное прохожденіе (decursus regularis) и вы такомы случай называются оны правильными (m. regulares); однако оны оты таковаго порядка иногда и уклоняются, и туть зовутся уже мелраєильными (m. anomali).

§. 124.

Находятся бользни, кои унвкоторых в больных в бывають по датливыми (benigni), а у других в злыми (maligni). По датливым суть простыя (§. 8.), правильныя (§. 123.) и истребляются хорошим в переломом в (§. 89.). Злыл же суть сложныя (§. 8.), неправильныя (§. 123.) и оканчиваются смертію (§. 92.), или в другую бользнь перемвняются (§. 95.), либо по крайней мърь таковою перемвною угрожають.

§. 125.

Непрерыеныя бользии (m. continui) сушь ть, кои отв начала даже до конца своего вы комылибо продолжаются. Ныкоторыя изы нихы однако суть послабляющія (remittentes) такь, что различныя степени бользни, ожесточеніе (exacerbatio) и послабленіе (remisho) одно за другимы поперемыно слыдующь. Естьли ожесточеніе бользни ежедневно случается то обыкновенно приходить оно вы вечеру (exacerbatio vespertina). Рыдко бользни бывають неослабными (continentes) такь, чтобы онь постоянно сь одина-

ковою силою, безb послабленія, продолжалися.

6. 126.

Есть также больни перемьжающіяся (m. intermittentes), кои не непрерывно продолжаются, но только особыми нападеніями (paroxyfmi) в больном оказываются и имбюшь должайшія или кратчайшія разстоянія (intervalla).

§. 127.

Нѣкоторыя изъ нихъ суть леріодическія или урочным (periodici s. typici) такъ, что онѣ въ опредъленные періоды опящь приходять. Порядокъ леріодовъ сихъ (tyриз) есть различень, почему и различають бользни ежедневныя (m. quotidiani), тредневныя (m. tertiani), четвероднееныя (m. quartani), мъсячныя (т. menstrui) и проч.

§. 128.

Ожесточение и послабление въ болъзняхъ послабляющихъ приходять также иногда періодическимъ образомъ.

§. 129.

Перемѣжающіяся и послабляющія 6олѣзни, коихъ пароксизмы или ожесточенія возвращаются вънеизвѣстное время, и слѣдственно св неравномѣрными разстояніями либо послабленіемв, называются нелорядочными (m. erratici).

§. 130.

Не рѣдко случается, что люди страдавшіе какоюлибо бользнію, спустя ньсколько времени посля выздоровленія, тоюже самою бользнію вновь поражаются. Бользнь такимь образомь приходящая обратно, зовется возвращающеюся (т. recidivus).

TAABA WECTAS

О разпознаваніи бользней

§. 131.

Отв отвлеченнаго познанія бользни отличать должно разпознаваніе (diagnofis) оной вв каждомв особо болящемв. Врачь приступающій льчить больнаго должень умьть разпознать или различить бользнь, которою больной его страждеть т. е. онь должень знать, какаго рода сія бользнь.

§. 132.

Тв вещи и обстоятельства, на разсуждении которых основывается разпознавание бользней, называются знаками (figna) бользней. Они суть либо такіе (empirica), кои чрез опыть, либо (rationalia), кои чрез умозаключенія къ разпознаванію бользней руководствують.

· §. 133.

Разпознаваніе извістной болізни основываєтся вопервых і на знаніи присущных і припадкові. Почему врачь и должень существенные припадки (§. 66.) тщательно отличать, дабы чрезі то опреділить классі, разряді, роді и породу болізни.

§. 134.

Врачь приобрѣтаеть познаніе припадковь частію чрезь собственное наблюденіе, посредствомь употребленія своихь чувствь (зрѣнія найпаче и осязанія, а вь нѣкоторыхь случаяхь притомь и обонянія), частію же чрезь повѣтствованіе больнаго и при немь нажодящихся.

§. 135. de

Во вторых вразпознавание бользни почерпаем вы изв лознания причинь. Посему и должень врачь стараться узнать причины, разпрашивая о том больнаго и трхв, коим прежнее его состояние извъстно. Къ разпознанию бользни не мало способствуеть то, естьли врачь сам примъчал род жизни въ больном его до бользни еще бывший.

§. 136.

Вившнія обстоятельства, ві которых в больной находится, способствують также кі разпознанію бользни какі потому, что врачь чрезі разсужденіе оных в можеть доискаться причины, такі и для того, что свойство бользней нікоторымі образомі оті дійствія оных вависить.

§. 137.

При разпознаваніи Епидемических вользней врачь вы каждомы порознь случаь оных врачь деласть заключеніе изв познанія Елидемического состоянія, кото-

рое приобрѣль онь чрезь прилѣжное наблюденіе больных Епидемическою бользнію до того времени страдаващихь.

§. 138.

Наконець полезное или вредное дъйствие употребленных уже средство (поcentia et iuvantia) руководствуеть также кь познанію свойства бользни.

§. 139.

Но какъ вст сіи источники нашего какойлибо бользни разпознаванія вообще сушь недостаточны къ доставленію намь точнаго разпознанія: по мы и должны большею частію правдоподобіємь довольствоваться и только старашься здълать оное, сколько можно, върнъйшимь.

ГЛАВА СЕДМАЯ

О предбузнаваніи во бользняхв.

12/10 . d 12/1 §. 140.

Предбузнавание (prognosis) вы бользняхы предбусматриваеты окончание оных и изв него врачь тоже самое предсказываеть. Онв заключаеть т. е. изв нвкоторых изв встных вещей и обстоятельствь, что бользны или излычится, или смертю кончится, или перейдеть вы другую бользны.

§. 141.

Сіе предрузнаваніе почерпасмо мы вопервых в изв качества бользни, т. е. находятся некоторыя бользни, коихь злосшь изв опышовь уже известна. Есть напротивь того другія, о коихь изь опыта знаемь, что онь вообще одною нашурою, или при помощи искуспіва, легко излічиваются. О ніжопорыхв знаемв, что онв очень скоро умерщвляють, другія хотя медленно, но шакже вррно смершію оканчивающся. Чемь больше все шьло ошь бользни спраждеть; чемь больше сисшема нервовь разслабленна, или кв сильныйшему прошиводвиствію побуждается; чемь больше мозгв, сердце, легкое поражающся: тъмъ большая настоить опасносшь.

\$ 142. ... free to

Во вторых вы степени бользни. Таже порода бользни вы одномы человый бываеты жесточае, а вы другомы легчы, вы одномы злою, а вы другомы податливою. Чемы большую степень бользни припадки ея показываюты: тымы больше предлежиты опасности; а чемы меньшую: тымы больше остается надежды. Примытить однако должно, что злость бользни не всегда припадками обнаруживается, но часто бываеты скрытною, и потому обманчивою.

§. .143.

Вь премногихь породахь бользней находятся также извъстные особые припадки, хорошую подающіе надежду, и другіе напротивь того великою угрожающіе опасностію.

§. 144.

Далье обы окончаній больни заключаемы мы изб состоянія больного вив бользии. Вы большой опасности находятся новорожденные дыти, престарылые, роженицы, слабые. Всегда худо, естьли бользнь поражаеть часть бывшую уже до сего слабыйшею.

§. 145.


Напосльдокь предъузнаемь мы окончаніе бользни из различных сившних обстоятельство, вы коихы больной такимы образомы находится, что дыствію оныхы не можеть не быть подверженнымь.

















18.4.3.174.